



NAVODILO ZA UPORABO MAZILA DILTIAZEM

Diltiazem 2% lidokain 2% je magistralno zdravilo izdelano v lekarni.

(Navodila shranite, saj jih boste morda še kdaj potrebovali.)

Kaj je zdravilo in za kaj ga uporabljamo?

Zdravilo vsebuje zdravilni učinkovini diltiazem in lidokain.

Diltiazem je zaviralec kalcijevih kanalčkov iz skupine benzotiazepinov, zavira vstop kalcija skozi "počasne" kalcijeve kanalčke v celice žilnih gladkih mišic in v srčnomišične celice. Navadno se uporablja za zdravljenje srčnih obolenj. V proktologiji je namenjeno predvsem zdravljenju analne razpoke (fisura), saj sprošča mišico zapiralko in omogoča boljšo prekrvavitev kakor tudi celjenje in s tem zmanjšanje bolečin. Mazilo lahko uporabljamo tudi pri krču mišice zapiralko po operaciji zadnjika ali pri proktoloških krčih neznanega izvora.

Zdravilna učinkovina lidokain, je površinski anestetik za sluznice in deluje lokalno protibolečinsko.

Zdravila ne uporabljate, če ste alergični na katerokoli učinkovino, ki jo vsebuje pripravek.

Kako uporabljati zdravilo?

Z mazilom se nanašate zjutraj, vsaj pol ure pred prvim odvajanjem. Nanesite manjšo količino mazila na svoj prst (za velikost graha). S prstom ga nanesete ob vhodu v zadnjik in tudi v sam zadnjični kanal za globino enega členka, na mestu največje bolečine s polkrožnimi gibi. Nanaša se ga 2-3 x dnevno. Prst se lahko zaščiti s plastično folijo ali z rokavico za enkratno uporabo. Po vsakem nanašanju si je potrebno umiti roke.

Zdravljenje navadno traja do prenehanja bolečin oz. 8 tednov v enem sklopu z namenom zmanjšanja možnosti ponovitve težav.

V primeru, da so vam mazilo dali skupaj z Dilatan čepom, mazilo uporabljajte v skladu z danimi navodili.

Možni neželeni učinki:

Kot vsa zdravila, ima tudi vaše zdravilo neželene stranske učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh pacientih.

Zelo redko se lahko po uporabi mazila pojavi glavobol. Večina glavobolov je blagih, v tem primeru svetujemo tudi analgetik paracetamol (Lekadol, Daleron).

Opazite lahko omotico še posebno pri hitrem vstajanju iz nižjega položaja. Če občutite omotico, utrujenost, zamegljen vid se hitro usedite oz. ulezite, takrat ne upravljate vozila ali strojev.

Pride lahko do lokalne reakcije in draženja kože, če se stanje poslabšuje, z uporabo prenehajte.

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Rok uporabe je označen na embalaži. Zdravilo je namenjeno osebni uporabi. Po odprtju mazilo zaradi lažjega nanašanja hranite v hladilniku, sicer pa je obstojno tudi na sobni temperaturi.

Diltiazem mazilo lahko, če poide, prevzamete pri nas še šest mesecev po zadnjem pregledu, kasneje le, če vas ponovno pregleda zdravnik.